Study or subgroup	Ablation/resection Events	Total	Hysterectomy Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, fixed, 95% CI
1.1.1 Up to two years after treatment						
Cooper, 2019	160	277	225	277	0.0%	0.71 [0.63, 0.80]
Crosignani, 1997	34	35	44	44	0.0%	0.97 [0.90, 1.04]
Dickersin, 2007	69	106	100	107	34.6%	0.70 [0.60, 0.81]
Dwyer, 1993	23	77	70	70	0.0%	0.30 [0.22, 0.43]
Elmantwe, 2017	17	20	20	20	0.0%	0.85 [0.70, 1.05]
Gannon, 1991	21	25	26	26	0.0%	0.84 [0.70, 1.01]
Jain, 2016	19	19	20	20	0.0%	1.00 [0.91, 1.10]
LIN, 2006	29	30	30	30	0.0%	0.97 [0.88, 1.06]
Pinion, 1994	80	96	97	97	33.7%	0.83 [0.76, 0.91]
Zupi, 2003	78	89	92	92	31.6%	0.88 [0.81, 0.95]
Subtotal (95% CI)		291		296	100.0%	0.80 [0.75, 0.85]
Total events	227		289			
Heterogeneity: Chi^2=9.16; df=9 (*P*=0.01); I^2=78%						
Test for overall effect: Z=6.92 (*P*<0.00001)						
1.1.2 More than two years after treatment						
Dickersin, 2007	24	47	51	51	41.5%	0.52 [0.39, 0.68]
Pinion, 1994	71	73	66	66	58.5%	0.97 [0.93, 1.02]
Subtotal (95% CI)		120		117	100.0%	0.78 [0.71, 0.86]
Total events	95		117			
Heterogeneity: Chi^2=89.28; df=1 (*P*<0.00001); I^2=99%						
Test for overall effect: Z=4.85 (*P*<0.00001)						



Supplementary Fig. 2. Sensitivity analysis for the primary outcome. CI, confidence interval; df, degree of freedom.